

# BASAMID® G

Mikro-granulátum (MG), 965 g/kg dazomet (96,5 m/m %)

ROVARÖLŐ  
CSÁVÁZÓSZER

Mikro-granulátum (MG) 965 g/kg dazomet (96,5 m/m %)

Általános talajfertőtlenítő szer növényparazita fonálféreg, talajlakó gombák, csirázó gyommagvak ellen vetés, ültetés előtti talajkezelésre zárt termesztő berendezésben és szabadföldön. Zöldségfélék, komló, dísznövények, díszfaiskola, erdészeti csemetekert, gyümölcsfa iskola, szőlőiskola, gyümölcs-, szőlő-, komlótelepítés, gyógynövények talajának fertőtlenítésére használható fel.

14887/1977 MEM

**Forgalmazási kategória: III.**

**Az engedélykírat tulajdonosa, a növényvédőszer gyártója:**

Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA, Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brüsszel, Belgium, Telefon: 00 32 2 763 4059

**Engedélykírat tulajdonos hazai képviselője, forgalmazó:**

Arysta LifeScience Magyarország Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. Telefon: 06-1-335-2100.

www.arysta.hu

**Gyártási idő: (hónap/év)**

**Gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.**

**Eltarthatóság:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

**Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette! Gyermekektől elzárva tartandó. FIGYELEM! A Basamid G általános talajfertőtlenítőszer engedélykírata megváltozott Határozatszám: 04.2/2722-1/2016. NÉBIH. A Basamid G általános talajfertőtlenítőszer ugyanazon területen háromévente legfeljebb egyszer alkalmazható!**

HU-DAZ-003-19b (0716)

**Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199. A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**

**Cseber Nonprofit Kft.**

**A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a www.cseber.hu címen. 06-1-340-4888**



**EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:**

A készítmény p.o.LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): 596 mg/ttkg

**Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.**

**Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.**

**Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.**

**H302** Lenyelve ártalmas.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H319** Súlyos szemirritációt okoz.

**H335** Légúti irritációt okozhat.

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**P261** Kerülje a por/ permet belélegzését.

**P262** Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P280** Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

**P284** Légzésvédelem kötelező.

**P312** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

**P391** A kiömlött anyagot össze kell

gyűjteni.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részzeit ne

tisztítsa felszíni vizek közelében!

Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

**SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy dazometet tartalmazó bármilyen más készítményt ne**

**használgjon ugyanazon a területen háromévente egynél többször!**

**SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m**

**távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!**

**SpO2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**Munkaegészségügyi övrendszabályok:**

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknél: munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, por elleni védőszemüveg;

felhasználóknál: munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elszóródását, a szer porának szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését.

A munka közben gyakori kézmosás, a munka végeztével ruhaváltás és alapos tisztálkodás, illetve zuhanyozás szükséges.

**Elsősegélynyújtás:** Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát haladéktalanul félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**Terápia:** tüneti megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** specifikus antitóruma nincs.

**Várakozási idők:**

Munkaegészségügyi várakozási idő:

Zárt termesztő berendezésben: **3 nap;**

Szabadföldön: **0 nap**

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Rendeltetéseszerű felhasználás esetén nincs korlátozás.

**Figyelem**



**BASAMID® G**

Mikro-granulátum (MG), 965 g/kg dazomet (96,5 m/m %)

**Előírt növényvédelmi technológia**

**Kizárólag talajfertőtlenítő szerként használható fel!**

**A szer ugyanazon a területen háromévente legfeljebb egyszer alkalmazható!**

**Dohány, zöldség és dísznövény** palántanevelő ágyak talajának vetés előtti, valamint a növények cserepezéséhez használandó föld fertőtlenítésére 250 g/m<sup>3</sup> mennyiségben.

Szabadföldi és zárt termesztő berendezés alatti **zöldség- és dísznövénykultúrák, díszfaiskolák, erdészeti csemetekertek, gyümölcsfa- és szőlőiskolák**, természetett **gyógynövénykultúrák** talajának telepítés előtti fertőtlenítésére 50-60 g/m<sup>2</sup> mennyiségben.

**Gyümölcs-, szőlő- és komlótelepítések** talajának fertőtlenítésére 40-100 g/m<sup>2</sup> mennyiségben.

A készítmény a növényparazita fonálféreg (szabadon élő fonálféreg, gyökérgubacs-fonálféreg, szárfonálféreg stb.), kórokozó talajlakó gombák, csirázó gyommagvak és talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok, mocsospajor stb.) ellen hatásos.

**Szőlő-, gyümölcs-telepítések** talajának fertőtlenítése előtt előzetes talajvizsgálat alapján kell megválasztani a kijuttatandó mennyiséget, a fonálféreg egyedszám és faji összetétele alapján. A kijuttatott granulátumot 20-25 cm mélységbe kell bedolgozni. Erős fonálféreg fertőzöttség esetén (500 g talajmintában 10 db feletti (*Xiphinema*-, *Pratylenchus*-, *Longidorus* spp.)) és erősen gyökérmadányos területen 60-100 g/m<sup>2</sup> mennyiséget kell kijuttatni. Gyengébb fonálféreg fertőzéskor az egyéb talajkártévőktől függően 40-60 g/m<sup>2</sup> mennyiség kijuttatása is elegendő. A kezelés finom morzsálékos talajon végezhető el. A felületre kézi vagy gépi úton egyenletesen kijuttatott granulátumot 10-15 cm, szőlő-, gyümölcs-telepítés esetén 20-25 cm mélyre be kell dolgozni. A szer nedvesség jelenlétében 15-20 °C között gyors gázosodás útján fejti ki hatását, emiatt alacsony talajnedvesség esetén a kezelést követően 5-6 mm-es öntözés szükséges. A tartós hatás érdekében a kezelt területet, illetve földkupacot célszerű fóliával takarni.

**A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

Kultúra	Károsító	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyiség
Dohány, zöldség, dísznövény palántanevelő ágyak	növényparazita fonálféreg,(szabadon élő fonálféreg, gyökérgubacs- fonálféreg), kórokozó talajlakó gombák, csirázó gyommagvak, talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok, mocsospajor stb.)	3 év	250 g/m <sup>3</sup>
Zöldségfélék, dísznövények (szabadföldön és zárt termesztő berendezésben), díszfaiskola, erdészeti csemetekertek, gyümölcs és szőlőiskolák, természetett gyógynövények			50-60 g/m <sup>2</sup>
Gyümölcs-, szőlő-, komlótelepítések			40-100 g/m <sup>2</sup>

HU-DAZ-003-19b (0716)

A kezelés után 2 héttel, alacsonyabb hőmérséklet esetén (5-10 °C) 3-4 héttel, a talajt fel kell lazítani, illetve át kell lapátolni.

**A vetés, ültetés vagy telepítés előtt tesztvizsgálattal (saláta- vagy zsásza-teszt) meg kell győződni arról, hogy a talaj mentes-e fitotoxikus szermaradványoktól.** Csirázásgátlás esetén a talaj fellazítását, szellőztetését meg kell ismételni.

**A talajfertőtlenítő készítménnyel együtt szerves trágya és talajjavító meszesző anyagok kijuttatása tilos! Azokat a forgatás előtt kell a területre kijuttatni.**

**Zárt termesztő berendezésben történő alkalmazása csak növényektől mentes, üres házban történhet.**

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetéscím, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok) fellépése, vagy a kijuttatási technika.

**GYÁRTÓI AJÁNLÁS**

Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez, a termék hatásának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem.

Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal!

Az engedélykíratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed.

Tilos a készítmény kiserelése a gyártó, illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!