

GIBB plus

Vízoldható folyékony koncentrátum (SL)

Hatóanyag-tartalom: 10 g/l gibberellin A4/A7 (0,95 %m/m)

Növekedésszabályozó permetezőszer

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elől el kell zárni!

Használat előtt olvassa el a használati utasítást a címkén, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

A hatóanyagot és a növényvédőt szert gyártja, az engedély tulajdonosa:

Globachem nv

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 11 78 57 17

Forgalmazza és a hazai képviselőt ellátja:

Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: 06-1-335-2100

www.arystalifescience.hu

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:

04.2/3508-2/2011 MgSzH

Forgalmazási kategória: III.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 1 év.

Nettó tartalom: 1 l



5999502631919


Globachem

Munkaegészségügyi óvrendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés *előkészítőknek* és *kijuttatóknak*: előírászerű felhasználás esetén nem szükséges.

Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15–20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, szükség esetén orvosi ellátást biztosítani.

Ellenanyag: specifikus antitóduma nincs

Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Ingyenesen hívható segélykérő telefon: 06-80-201-199.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás előírásai:

Veszélyjel: nem jelölésköteles.

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke patkányon: >2000 mg/kg.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 Elelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

SP1 A növényvédőt szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen!



Felhasználható

Kultúra	Károsító	A kezeléseket maximális száma	A kezeléseket közötti min. időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha)	A kijuttatáshoz szükséges víz (l/ha)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiaihoz viszonyítva)
Alma	parásodás	4	10	0,5–1,0	600–1000	90%-os gyümölcsméret

Házikerti dózis: 5–10 ml/10 l víz.

Előírt növényvédelmi technológia: Almaültvényekben az arra érzékeny fajták parásodásának csökkentésére 0,5–1,0 l/ha dózisban, szirmhullás időszakától (BBCH 67) kezdődően maximum 4 alkalommal, 10–12 napos permetezési forduló betartásával célszerű alkalmazni a készítményt. A kezeléseket léggörpörasztásos permetezőgéppel, 600–1000 l/ha permetlé mennyiséggel javasolt elvégezni. A kijuttatás során törekedni kell, hogy a permetlé a lombzat belsejében is megfelelő borítottságot érjen el.

Használat előtt felrázandó!

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élmezés-egészségügyi várakozási idő: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A magasabb dózis használata parásodásra érzékeny fajta ill. arra hajlamosító körülmények esetén javasolt.

Gibb Plus használata után a következő évben előfordulhat, hogy a virágzás intenzitása kisebb mértékű, amennyiben a készítmény nem megfelelő időben (túl korán) és mennyiségben (túl magas dózisban) lett kipermetezve.

Keverhetőség:

A készítmény keverhető gombaölő szerekkel, **de egyéb növekedésszabályozó anyagokkal nem.** Permetlékészítés:

Használat előtt felrázandó. Töltsük meg a permetlé tartályt félig vízzel, adjuk hozzá a Gibb Plus javasolt mennyiségét, majd öblítsük ki a csomagoló anyagot. Folyamatos keverés mellett töltsük fel a tartályt vízzel a szükséges mértékig.



Arysta LifeScience

HU