

# TARGA SUPER

EC - Emulzióképző koncentrátum  
5 % m/m quizalofop-P-etil 50g/L

## Gyomirtó permetezőszer

**Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**

**Gyermekektől elzárva tartandó!**

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!**

**Forgalomba hozatali engedély száma:** 18/125/1995. FM

**Forgalmazási kategória:** III.

**Az engedélykírat tulajdonosa, a növényvédő szer gyártója:**

Nissan Chemical Industries Ltd., Japán

**Engedélykírat tulajdonos hazai képviselője, forgalmazó:**

Arysta LifeScience Magyarország Kft.,  
1023 Budapest, Bécsi út 3–5. Telefon: 06-1-335-2100 www.arysta.hu

**Kiszerező:** Nissan Chemical Industries Ltd., Japán

**Gyártási idő** (nap, hó, év), **gyártási szám, kiszérés ideje:**

A csomagolóburkolaton található.

**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3** év.

**Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:**



## Veszély

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):  
>2000 mg/ttkg

**Tűzveszélyességi besorolás:**

tűzveszélyes folyadék (3. kategória).

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**  
közepesen veszélyes.

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles.

**Nettó  
tartalom: 5 liter**



**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz. **H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H318** Súlyos szemkárosodást okoz. **H332** Belélegezve ártalmas. **H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **H351** Feltehetően rákot okoz.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. **P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P308+P313** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P403+P235** Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

**SPe3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **30 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

**SPO2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

## Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

**Munkaegészségügyi óvrendszabályok:** Egyéni védőfelszerelés *előkészítőknél* és *kijuttatóknak*: növényvédő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg, védőkalap.

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: *általános eljárás*) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti, megfigyelő kezelés.

Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatától (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).

**Ingyenesen, éjjel-nappal hívható segélykérő telefon: 06-80-201-199.**

**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 3 nap.

**Élmezés-egészségügyivárakozási idő:** Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.



## A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges	
		szer mennyiség l/ha,	víz mennyiség l/ha
Cukorrépa, napraforgó, szója, bab, borsó, lencse, len, repce, szőlő, almatermésűek, lucerna, paradicsom, paprika	magról kelő egyszikű gyomnövények <i>Sorghum halepense</i> magról kelő <i>Sorghum halepense</i> rizómáról kelő <i>Agropyron repens</i> <i>Cynodon dactylon</i>	0,7–1,0 0,8 1,0–1,2 2,0–2,5 3,0–3,5	200–300
Repce	gabona árvalék	0,4–0,6	200–300
Erdészeti	siska nádtippan	3,0–3,5	250–300

## Előírt növényvédelmi technológia:

A kezelést **cukorrépában** a kultúrnövény 4–6 leveles korától 8–10 leveles fejlettségéig, **napraforgó, repce, len** kultúrákban 4–6 leveles, **szója, lucerna** 5–15 cm-es, **borsó, bab** 8–10 cm-es fejlettségi állapotában, **almatermésű és szőlő** kultúrákban a gyomfejlettséghez igazodva a vegetációs időszakban lehet elvégezni a gyomok 3–5 leveles fejlettségénél.

**Paradicsomban, paprikában** a kultúrnövény 4–6 leveles fejlettségétől, a magról kelő egyszikűek esetében azok 2 leveles korától bokrosodásukig, az évelő egyszikűeknél az intenzív növekedési szakaszban, 10–15 cm-es fejlettségükkor kell a kezelést elvégezni.

**Repcebén** gabona árvaléknel a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erős árvalék vagy kissé megkésített kezelés esetén a magasabb dózis alkalmazása szükséges.

A készítmény felhasználható **erdészeti**ben, felszaporodó siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) ellen. A készítményt a gyomnövény intenzív növekedési szakaszának kezdetén kell kipermetezni, a megkésített kezelés a hatékonyságot rontja.

**Dózisa 10 liter vízhez: 0,1 liter.**

**Légi kijuttatás: –**

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!**

**CSEBER Non-profit Kft.** növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható

a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43–45.

Tel.: +36 1 340 5411

